

ANEXO II

QUESTÕES E GABARITO DO PROCESSO SELETIVO DE VAGAS REMANESCENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA INTENSIVA

1 - Em relação à doença do refluxo gastroesofágico, é correto afirmar:

- a) Os sintomas atípicos são a regurgitação, náuseas, halitose, rouquidão e dor torácica.
- b) O exame padrão ouro para diagnóstico é a endoscopia digestiva alta.
- c) **A irritação prolongada faz com que as células que revestem o esôfago sofram alterações, o que causa um quadro clínico denominado esôfago de Barrett.**
- d) A prevalência e a gravidade da doença reduziram nos últimos anos.
- e) Tabagismo e cafeína não estão relacionados ao aparecimento do refluxo gastroesofágico.

2 - Sobre hérnia inguinal, assinale a alternativa incorreta:

- a) A hérnia inguinal ocorre quando o conteúdo do abdome ou da pelve se protrai através de um anel interno dilatado ou um assoalho inguinal adelgado no canal inguinal.
- b) O tratamento cirúrgico é indicado para homens sintomáticos com hérnia inguinocrural.
- c) Em caso de hérnias estranguladas com contaminação do campo operatório (perfuração de alça intestinal, peritonite ou abscesso) o uso de telas deve ser evitado.
- d) **Todos os pacientes devem realizar US para o diagnóstico correto.**
- e) A herniorrafia inguinal é um dos procedimentos cirúrgicos mais realizados no mundo por tratar-se de doença que incapacita as pessoas para o trabalho, gerando ônus econômico e social para o próprio indivíduo e para a sociedade.

3 - Paciente idosa, 80 anos, apresenta quadro de distensão e dores abdominais intermitentes há cerca de sete dias seguidos de vômitos persistentes desde o dia anterior. Nega cirurgias prévias.

Ao exame: depletada, acianótica, afebril. Abdome distendido, doloroso à palpação profunda. Descompressão brusca negativa. Nesse caso, a etapa seguinte no seguimento dessa paciente é:

- a) Inserir sonda nasogástrica, deixar a paciente em jejum e iniciar NPT
- b) Realizar endoscopia e colonoscopia de emergência
- c) Prosseguir para laparotomia exploradora imediata
- d) **Realizar tomografia computadorizada de abdome**
- e) Realizar fleet enema na emergência.

4 - A causa mais frequente de obstrução intestinal é:

- a) **Aderências de cirurgias prévias**
- b) Hernia de parede abdominal
- c) Adenocarcinoma colorretal

- d) Carcinomatose peritoneal
- e) Ileo metabólico.

5 - São contraindicações absolutas ao uso de fibrinolíticos no IAMCSST, exceto:

- a) AVC isquêmico nos últimos 6 meses
- b) Distúrbio de coagulação conhecido
- c) **Endocardite infecciosa**
- d) Hemorragia digestiva no último mês
- e) Gestação.

6 - Sobre HDA (hemorragia digestiva alta), assinale o correto:

- a) **A hemorragia digestiva alta refere-se ao sangramento derivado de lesões no trato gastrointestinal superior proximal ao ângulo de Treitz, principalmente esôfago, estômago e duodeno.**
- b) A taxa de hospitalização para HDA é praticamente a mesma se comparada com sangramento gastrointestinal inferior.
- c) A EDA é o principal exame diagnóstico e terapêutico na HDA e é responsável pelo diagnóstico etiológico em 100% dos casos.
- d) Lesões vasculares no TGI podem causar sangramento, como as lesões de Dieulafoy, angiodisplasias e ectasia vascular antral gástrica (GAVE). Angiodisplasias são as anomalias vasculares menos comuns encontradas no trato GI.
- e) Os achados endoscópicos em pacientes com varizes esofágicas podem ser descritos de acordo com a classificação de Forrest.

7 - Em relação as cefaleias, considere as seguintes alternativas:

- I. São tipos de cefaleias primárias: Enxaqueca, cefaleia tensional e cefaleia em salvas.
- II. Cefaleia Crônica Diária é uma situação que se caracteriza por dores de cabeça em pelo menos 15 dias ao mês. Ela é uma evolução das outras formas de cefaleia, que aumentam de frequência gradativamente por uso exagerado de analgésicos para dor.
- III. A prevalência populacional global da enxaqueca é estimada em 45%, sendo mais frequente no sexo masculino. A enxaqueca com aura é muito comum, acometendo 90% dos pacientes.

Assinale a alternativa correta:

- a) Somente a afirmativa II é verdadeira.
- b) **Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.**
- c) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas III é verdadeiras.
- e) Todas as alternativas são falsas.

8 - Homem, 63 anos, com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, internado por ganho ponderal de 22 kg no último mês, dispneia e cansaço ao repouso, sonolência, ortopneia e oligúria. Exame físico: estertores pulmonares difusos bilaterais, edema de membros inferiores 3+/4+, extremidades frias e mal perfundidas.

Após 48 horas de tratamento com furosemida e dobutamina perdeu 4 kg, com resolução das manifestações de baixo débito. Optado por desmame da dobutamina, introdução de hidralazina e nitrato com progressão até doses máximas. Durante o desmame da dobutamina, as manifestações de baixo débito retornaram.

Além do retorno da dobutamina, qual a conduta mais adequada neste momento?

- a) Associar segundo inotrópico.
- b) **Controlar a volemia.**
- c) Associar vasopressor.
- d) Suspende vasodilatadores.
- e) Associar corticoide.

9 - Adolescente do sexo masculino, 16 anos, é levado à emergência por amigos após ter consumido álcool e substância psicoativa não identificada em uma festa. Ao exame físico apresenta-se agitado, sudoreico, febril, hipertenso e com pupilas midriáticas. Qual a provável substância em questão e seu respectivo princípio ativo:

- a) **Ecstasy (MDMA, 3-4-metilenodioximetanfetamina).**
- b) "Ácido" (LSD, dietilamina do ácido lisérgico).
- c) Maconha (THC, delta-9-tetrahydrocannabinol).
- d) Cola (inalante volátil a base de Tolueno).
- e) Chá de cogumelo (Psilocibina)

10 - Menina, 09 anos, apresenta febre alta há cinco dias, cefaleia e dor retro orbitária. Hoje pela manhã apresentou dor abdominal de forte intensidade e irritabilidade. A conduta para essa paciente é:

- a) Hidratação oral, dipirona e alta.
- b) **Hidratação venosa, dipirona e internação hospitalar.**
- c) Hidratação venosa, ibuprofeno e observação por 12 horas.
- d) Hidratação oral, antiespasmódico e observação por seis horas.
- e) Hidratação oral, ibuprofeno e alta.

11 - Pré-escolar, 04 anos, apresenta há sete dias secreção e obstrução nasal, porém há 01 dia, mãe notou a presença de febre alta (39oC), com piora da tosse e queda do estado geral.

Exame físico: eupneico, sem dificuldade respiratória. Oroscoopia: hiperemia de faringe com drenagem de secreção posterior e visualização de crostas amareladas no vestibulo nasal.

A conduta indicada neste caso é utilizar:

- a) Soro fisiológico e corticoide nasais.
- b) **Anti-histamínico oral e corticoide nasal.**

- c) **Antibioticoterapia oral e soro fisiológico nasal.**
- d) Corticoide de baixa potência oral e soro fisiológico nasal.
- e) Soro fisiológico nasal e anti-inflamatório.

12 - Sobre as doenças exantemáticas, leia as afirmativas:

- I) Síndrome mão-pé-boca é uma infecção viral de transmissão fecal-oral ocasionada pelo vírus Coxsackie A16.
- II) O exantema é uma erupção cutânea que pode ser maculopapular, papulovesicular ou formada por petéquias e púrpuras. As lesões podem apresentar aspecto irregular e edemaciado, estando ou não associadas a prurido, descamação, lesões bolhosas e crostas.
- III) O sarampo é uma doença viral aguda causada pelo Morbilivirus. Cursa com febre alta e exantema maculopapular generalizado, geralmente associado a tosse, coriza e conjuntivite. Um dos achados típicos são as manchas de koplik.

Assinale a alternativa correta:

- a) **Todas as alternativas são verdadeiras.**
- b) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
- c) Todas as alternativas são falsas
- d) Somente a alternativa III é falsa.
- e) Somente a alternativa III é verdadeira.

13 - Mulher de 40 anos, procura atendimento no ambulatório de ginecologia com queixa de fluxo vaginal de coloração branco-acinzentada em pequena quantidade, com odor fétido do tipo "odor de peixe", que piora durante o período menstrual. O agente etiológico mais provável é:

- a) Candida albicans
- b) **Gardnerella vaginalis**
- c) Trichomonas vaginalis
- d) Neiseria gonorrhoeae
- e) E. coli

14 - Sobre a endometriose, assinale a alternativa incorreta:

- a) Endometriose é uma doença ginecológica crônica, benigna, estrogênio-dependente e de natureza multifatorial que acomete principalmente mulheres em idade reprodutiva.
- b) Os principais sintomas associados são dismenorreia, dor pélvica crônica, dispareunia de profundidade, alterações intestinais cíclicas, alterações urinárias cíclicas e infertilidade.
- c) Em pacientes com endometrioma ovariano, o procedimento cirúrgico deve ser indicado nos endometriomas volumosos ou com dúvida para comprovação histológica.
- d) **O tratamento medicamentoso hormonal para supressão ovariana em pacientes com infertilidade e endometriose deve ser prescrito já na suspeita diagnóstica.**
- e) Nódulos ou rugosidades enegrecidas em fundo de saco posterior ao exame especular sugerem a doença.

15 - Primigesta, 23 anos, é trazida à Emergência de uma Maternidade pelos familiares. Histórico de bolsa rota com líquido claro há aproximadamente 40 minutos. IG:37+5s, pré-natal de baixo risco na UBS. Apresenta contrações cada vez mais fortes e dolorosas, rítmicas – 3 contrações em 5 minutos.

Toque vaginal com colo dilatado de 10 cm, feto em apresentação cefálica, no plano +1 de DeLee. Frequência cardíaca fetal: 144 bpm. Nesta situação, o plantonista deve:

- a) **conduzir a gestante de maca até o Centro Obstétrico e realizar o parto normal.**
- b) Encaminhar a paciente ao pré-parto e incentivar o banho morno.
- c) Realizar cesariana de emergência.
- d) Realizar cardiotocografia
- e) Iniciar analgesia peridural e infundir ocitocina endovenosa.

16 - Assinale a alternativa que corresponde aos subtipos mais comuns do Papilomavírus Humano (HPV) associados aos condilomas genitais.

- a) HPV 4 e 7.
- b) **HPV 6 e 11.**
- c) HPV 18 e 24.
- d) HPV 22 e 23.
- e) HPV 18 e 72.

17 - A Lista Nacional de Notificação Compulsória de Doenças, Agravos e Eventos de Saúde Pública inclui:

- a) Acidente com aranha-marrom, doença mão-pé-boca e leptospirose.
- b) Meningite meningocócica, violência contra o idoso e diarreia aguda.
- c) **Acidente com aranha-marrom, Meningite meningocócica e leptospirose.**
- d) Meningite viral, diarreia aguda, leishmaniose.
- e) Botulismo, escabiose, sarampo.

18 - Sobre a vacina contra o HPV, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

() É produzida através da tecnologia de DNA recombinante, com partículas semelhantes ao capsídeo viral (VLPs).

() A vacina contra HPV é indicada para pessoas de 9 a 45 anos.

() Quem já fez três doses da vacina quadrivalente não pode realizar a nonavalente

- a) **V – V – F**
- b) V – V – V
- c) F – F – V
- d) V – F – F
- e) F – V – F

19 - Dentre os princípios e diretrizes do SUS, assinale a alternativa incorreta:

- a) Equidade: Busca garantir que quem mais precisa receba a atenção adequada. Tratar desigualmente os desiguais, de acordo com suas necessidades.
- b) Descentralização: redistribuição das responsabilidades quanto às ações e serviços de saúde entre os vários níveis de governo.
- c) **Universalidade: todos os cidadãos brasileiros têm direito à saúde, em qualquer nível de atenção, no Território Nacional. Com exceção aos estrangeiros que estejam morando ou a passeio no Brasil.**
- d) Hierarquização: Organização dos serviços de saúde em níveis de complexidade tecnológica crescente.
- e) Participação social: Os governantes garantem à população a possibilidade de participar dos processos relacionados ao sistema.

20 - Homem, 42 anos, se envolveu em um acidente de trânsito. Sofreu um TCE grave com fratura de base de crânio e necessidade de abordagem neurocirúrgica de emergência. No internamento, evoluiu com difícil desmame da ventilação mecânica, pneumonia associada a ventilação mecânica, injúria renal aguda e necessidade de hemodiálise. Veio a falecer após 20 dias de internamento na UTI por choque séptico.

Considerando os dados acima, em relação ao correto preenchimento do atestado de óbito, a causa básica da morte e quem deve fornecer a Declaração de óbito são, respectivamente:

- a) Choque séptico e IML
- b) Acidente de trânsito e UTI.
- c) Choque séptico de UTI
- d) **Acidente de trânsito e IML.**
- e) TCE e médico neurocirurgião.

GABARITO									
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
C	D	D	A	C	A	B	B	A	B
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C	A	B	D	A	B	C	A	C	D